

■ ■ ■ 大腸内視鏡検査を受けられる方へ ■ ■ ■

検査前日【 月 日】

- 食事・・・検査食(ダラムベース)のみ 他の物は摂らないでください
- 水分・・・水 or お茶のみ
- クスリ・・・常備薬は通常通り服薬
就寝前 コップ1/3杯の水に緩下剤(ラキソベロン10ml)を入れ飲みます

脱水を予防するため、夕食後から翌朝7時までは適度に水分を摂ってください

検査当日【 月 日】

- 食事・・・朝食・昼食は摂らないでください
- 水分・・・水 or お茶(脱水を予防するため朝7時までは適度に水分を摂ってください)
- クスリ・・・血圧・心臓の薬を服薬している方は、食事に関係なく時間ごとに飲んでください
糖尿病薬使用の方は、糖尿治療薬は中止 検査終了後は開始の支持を仰ぐ
朝7時、ガスモチン1錠を服薬


○ニフレックを開始

ニフレック液を作る

袋の下の線まで水を加え、薬をよく溶かします

上の線まで水を加え2リットルの腸管洗浄液を作ります

コップ1杯を15分かけてゆっくりと飲み、検査ができる状態になるまで繰り返します



- 電話で進行状況等の連絡を取る 午前8時 10時 12時
排便回数 便の色 カスの有無 濁りや透明感など

○ニフレック終了後

脱水予防の為ポカリスエットか紅茶(砂糖は○ 乳製品×)を少しずつ飲んでください
便意がなくなってきたりもなるべく排便を繰り返してください

下記の様な症状がある場合はご連絡ください

☎0436(21)0011

- | | | | |
|---------|--------|---------|--------|
| ・気分が悪い | ・お腹が痛い | ・めまいがある | ・息苦しい |
| ・吐き気がある | ・お腹が張る | ・蕁麻疹が出る | ・胸が痛い |
| ・吐いた | ・寒気がある | ・顔が青ざめる | ・動悸がする |
| ・体がだるい | | | |

- 来院時間・・・(:) ポカリスエットや紅茶持参で来院