

抗生剤アレルギー歴

10年以内の、抗生剤によるアレルギー反応

ある

なし

半年前 半年～1年 2年～5年 6年～10年 不明

薬品名を記入し、反応開始時間を右記より選択

点滴

経口薬

点滴

経口薬

点滴

経口薬

- 10年以上前に言われた
- 症状はないが記録が残っている
- 家族がペニシリンアレルギー

反応開始時間

- ① 直ぐの反応 (4時間以内)
- ② 中間 (4～24時間)
- ③ 遅くの反応 (24時間以上)
- ④ 不明

出現した症状全てに✓を入れてください

- 下痢 悪寒 頭痛 疲労感 痒み
- 吐き気
- 嘔吐
- 腹痛

- アナフィラキシー 口唇の腫脹 気管支痙攣
- 咳 鼻の症状 不整脈
- 喉の違和感 低血圧 顔面紅潮
- 息切れ 発疹 失神・気絶
- 喘鳴 めまい

- スティーブンジョンソン症候群 (粘膜病変を伴う発疹)
- 血清症 (関節痛・発熱・筋肉痛を伴う発疹)
- 血小板減少症
- 発熱
- 臓器損傷 (肝臓・腎臓)
- 多型紅斑 (境界が明瞭で円形や環状の隆起した紅斑)
- ジストニア
- 貧血
- 急性発疹 (膿疹を伴う発疹)
- 薬物反応性好酸球増多症 及び 全身症状
(好酸球増多症 及び 臓器損傷を伴う発疹)
- その他の症状

📌 主な薬品名

ペニシリン系

アモキシシリン
アモリン
サワシリン
パセトシン
ピクシリン
ペングッド
ペントシリン
ユナシン
ワイドシリン

セファロスポリン系

ケフレックス
オラスポア
オラセフ
ケフラル
ドルセファン
セフゾン
セフスパン
バナソ
セフテム
メイアクト
フロモックス