

ホームへ

クイックナビ

- 用法・用量を見る
- 同効薬を見る
- 後発薬を見る
- 副作用を見る
- 腎機能低下時投与量を見る
- 妊娠への危険度を見る
- 薬理情報を見る
- 添付文書を見る

--完全マッチ結果--

薬剤

<p>フォシーガ錠5mg フォシーガ錠10mg</p> <p>ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物 Dapagliflozin Propylene Glycolate Hydrate</p> <p>中分類： 糖尿病治療薬 &gt; 選択的SGLT2阻害剤</p> <p>添付文書：  00062726</p> <p>商標名： forxiga 5mg tablets forxiga 10mg tablets</p> <p>製剤名： ダバグリフロジンプロピレングリコール錠</p> <p>会社名： 26.1 製造販売元：アストラゼネカ株式会社 26.2 販売：小野薬品工業株式会社</p> <p>ユニット： 5mg1錠：195.1円/錠 10mg1錠：290.5円/錠</p> <p>代表薬名 (フォシーガ)</p> <p>添付文書改訂日 2019年12月</p> <p>薬価データ掲載日 2020年4月</p>	<p><b>効能・効果</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○2型糖尿病</li> <li>○1型糖尿病</li> </ul> <p><b>用法・用量</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;2型糖尿病&gt;             <ul style="list-style-type: none"> <li>通常、成人にはダバグリフロジンとして5mgを1日1回経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら10mg1日1回に増量することができる。</li> </ul> </li> <li>&lt;1型糖尿病&gt;             <ul style="list-style-type: none"> <li>インスリン製剤との併用において、通常、成人にはダバグリフロジンとして5mgを1日1回経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら10mg1日1回に増量することができる。</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>【禁忌】</b></p> <p>次の患者には投与しないこと</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者</li> <li>2.2 重症ケトアシトシス、糖尿病性昏睡又は前昏睡の患者 [輸液、インスリンによる速やかな高血糖の是正が必須となるので本剤の投与は適さない。]</li> <li>2.3 重症感染症、手術前後、重篤な外傷のある患者 [インスリン注射による血糖管理が望まれるので本剤の投与は適さない。]</li> </ul>																											
<p>■先発薬・後発薬 商品名</p> <table border="1"> <tr> <th>商品名一覧</th> <td>先発品：フォシーガ</td> </tr> </table>			商品名一覧	先発品：フォシーガ																									
商品名一覧	先発品：フォシーガ																												
<p>■同効薬</p> <table border="1"> <tr> <th>薬理情報</th> <td>糖尿病治療薬 &gt; 選択的SGLT2阻害剤</td> </tr> <tr> <th>同効薬一覧</th> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>スーグラ錠など (イブラグリフロジン)</li> <li>ルセフィ錠など (ルセオグリフロジン)</li> <li>デベルザ錠など (トホグリフロジン)</li> <li>フォシーガ錠など (ダバグリフロジン)</li> <li>カナグル錠など (カナグリフロジン)</li> <li>ジャディアンス錠など (エンバグリフロジン)</li> </ul> </td> </tr> </table>			薬理情報	糖尿病治療薬 > 選択的SGLT2阻害剤	同効薬一覧	<ul style="list-style-type: none"> <li>スーグラ錠など (イブラグリフロジン)</li> <li>ルセフィ錠など (ルセオグリフロジン)</li> <li>デベルザ錠など (トホグリフロジン)</li> <li>フォシーガ錠など (ダバグリフロジン)</li> <li>カナグル錠など (カナグリフロジン)</li> <li>ジャディアンス錠など (エンバグリフロジン)</li> </ul>																							
薬理情報	糖尿病治療薬 > 選択的SGLT2阻害剤																												
同効薬一覧	<ul style="list-style-type: none"> <li>スーグラ錠など (イブラグリフロジン)</li> <li>ルセフィ錠など (ルセオグリフロジン)</li> <li>デベルザ錠など (トホグリフロジン)</li> <li>フォシーガ錠など (ダバグリフロジン)</li> <li>カナグル錠など (カナグリフロジン)</li> <li>ジャディアンス錠など (エンバグリフロジン)</li> </ul>																												
<p>■腎機能低下時の薬剤投与量 (日本腎臓病薬物療法学会) (参照：腎障害と薬剤投与量)</p> <p>ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物:フォシーガ錠</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">常用量</th> <th colspan="3">GFRまたはCCr(mL/min)</th> <th rowspan="2">HD (血液透析)</th> <th rowspan="2">透析 性</th> <th rowspan="2">禁忌</th> <th rowspan="2">腎障 害</th> </tr> <tr> <th colspan="3">&gt; 腎機能の計算機(推定CCr, eGFRの計算)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>30~59</td> <td>15~29</td> <td>&lt;15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1日1回5mgを経口投与。1日1回10mgまで増量可</td> <td>十分な効果が得られない可能性があるため慎重投与。</td> <td>高度腎機能障害患者または透析中の末期腎不全患者では効果が期待できないため、投与しない。</td> <td></td> <td></td> <td>×</td> <td>禁</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>			常用量	GFRまたはCCr(mL/min)			HD (血液透析)	透析 性	禁忌	腎障 害	> 腎機能の計算機(推定CCr, eGFRの計算)				30~59	15~29	<15					1日1回5mgを経口投与。1日1回10mgまで増量可	十分な効果が得られない可能性があるため慎重投与。	高度腎機能障害患者または透析中の末期腎不全患者では効果が期待できないため、投与しない。			×	禁	○
常用量	GFRまたはCCr(mL/min)			HD (血液透析)	透析 性	禁忌					腎障 害																		
	> 腎機能の計算機(推定CCr, eGFRの計算)																												
	30~59	15~29	<15																										
1日1回5mgを経口投与。1日1回10mgまで増量可	十分な効果が得られない可能性があるため慎重投与。	高度腎機能障害患者または透析中の末期腎不全患者では効果が期待できないため、投与しない。			×	禁	○																						
<p>■妊娠中患者への使用に関する情報 (参照：「妊娠、授乳期の薬物使用」)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>胎児への危険度情報 (ClinicalKeyなどより作成)             <ul style="list-style-type: none"> <li>FDA薬剤胎児危険度分類基準 C。(説明)</li> </ul> </li> </ul>																													
<p>注意：使用上の注意 (慎重投与対象患者、使用・適応上の注意、高齢者・妊婦・授乳婦・小児などへの投与時の注意点、薬物動態など) </p>																													
<p>注意：併用注意 </p>																													
<p>副作用：重大な副作用 </p>																													
<p>副作用：その他の副作用 </p>																													

# 今日の臨床サポート

本サイトの知的財産権は全てエルゼビアまたはコンテックスのライセンサーに帰属します。私的利用及び別途規定されている場合を除き、本サイトの利用はいかなる許諾を与えるものでもありません。本サイト、そのコンテンツ、製品およびサービスのご利用は、お客様ご自身の責任において行ってください。本サイトの利用に基づきいかなる損害についても、エルゼビアは一切の責任及び賠償義務を負いません。また、本サイトの利用を以て、本サイト利用者は、本サイトの利用に基づき第三者に生じうるいかなる損害についても、エルゼビアを免責することに同意したことになります。本サイトを利用される際、本サイトの利用は、始末の御自身の責任とさせていただきます。本サイトの利用が別所において行なわれるものとして扱われる場合は、コンテックスにおいて提案されている検査または処置がなされるべきではありません。医学の急速な進歩に鑑み、エルゼビアは、本サイト利用者が診断方法および投与量について、独自に検証を行うことを推奨いたします。

使用条件    プライバシーポリシー    ユーザー同意書



- ホームへ
- クイックナビ
- ▶ [用法・用量を見る](#)
- ▶ [同効薬を見る](#)
- ▶ [後発薬を見る](#)
- ▶ [副作用を見る](#)
- ▶ [腎機能低下時投与量を見る](#)
- ▶ [妊娠への危険度を見る](#)
- ▶ [薬理情報を見る](#)
- ▶ [添付文書を見る](#)
- 完全マッチ結果--