

*** 大腸内視鏡検査を受けられる方へ ***

検査前日【 月 日】

- 食事・・・検査食(ダルムベース)のみ 他の物は摂らないでください
 - 水分・・・水 or お茶のみ
 - クスリ・・・常備薬は通常通り服薬
就寝前 コップ1/3 杯の水に緩下剤(ラキソベロン10ml)を入れ飲みます
- 脱水を予防するため、夕食後から翌朝7時までには適度に水分を摂ってください

検査当日【 月 日】

- 食事・・・朝食・昼食は摂らないでください
- 水分・・・水 or お茶(脱水を予防するため朝7時までには適度に水分を摂ってください)
- クスリ・・・**血圧・心臓の薬を服薬している方は、食事に関係なく時間ごとに飲んでください**
糖尿病薬使用の方は、糖尿治療薬は中止 検査終了後は開始の支持を仰ぐ
朝7時、ガスモチン1錠を服薬
- ビジクリア配合錠を開始
飲み方・・・シートから**5錠**を出し、水またはお茶**200ml**で**15分以内**に飲む
*指定された水分量を守る
チェックシートを用意し、5錠飲むごとに記入する
- 電話で進行状況等の連絡を取る **午前8時 10時 12時**
排便回数 便の色 カスの有無 濁りや透明感など
- ビジクリア終了後
脱水予防の為ポカリスエットか紅茶(砂糖は○ 乳製品×)を少しずつ飲んでください
便意がなくなってきたもなるべく排便を繰り返してください

下記の様な症状がある場合や薬を飲み忘れた時はご連絡ください ☎0436(21)0011

・気分が悪い	・お腹が痛い	・めまいがある	・息苦しい
・吐き気がある	・お腹が張る	・蕁麻疹が出る	・胸が痛い
・吐いた	・寒気がある	・顔が青ざめる	・動悸がする
・体がだるい			

○来院時間・・・(:) ポカリスエットや紅茶持参で来院