

抗生剤アレルギー歴

10年以内の、抗生剤によるアレルギー反応

ある

なし

半年前 半年～1年 2年～5年 6年～10年 不明

薬品名を記入し、反応開始時間を右記より選択

点滴

経口薬

点滴

経口薬

点滴

経口薬

10年以上前に言われた
 症状はないが記録が残っている
 家族がペニシリンアレルギー

反応開始時間

① 直ぐの反応（4時間以内）

② 中間（4～24時間）

③ 遅くの反応（24時間上）

④ 不明

出現した症状全てに✓を入れてください

痒み

吐き気 嘔吐 腹痛 下痢

悪寒

頭痛

疲労感

アナフィラキシー 口唇の腫脹

気管支痙攣 咳 鼻の症状

不整脈

喉の違和感 低血圧 顔面紅潮

息切れ 発疹 失神・気絶

喘鳴 めまい

その他の症状

📌 主な薬品名

ペニシリン系

アモキシシリン

アモリン

サワシリン

パセトシン

ピクシリン

ペングッド

ペントシリン

ユナシン

ワイドシリン

セファロスポリン系

ケフレックス

オラスポア

オラセフ

ケフラル

ドルセファン

セフゾン

セフспан

パナン

セフテム

メイアクト

フロモックス