


「カラー発疹症」

この書籍は古く絶版になっていますが
的確な写真が載っており今でも参考に
成るので掲載します。



風疹の主要症状と経過概要



a. 2 疹日 (3 病日) の皮疹



b. 硬口蓋のケシ粒大の瀉胞状物



c. 乳児の皮疹, 3 疹日, 7 カ月♀



d. 幼児の皮疹, 2 疹日, 1 歳 4 カ月♂



e. 2 疹日の疹




f. 1 疹日の疹



g. 小児の皮疹, 2 疹日, 3 歳 6 ヶ月



h. 22歳, 1疹日



i. 左の症例の2疹日




j. 目の充血



k. 硬口蓋の出血斑

疹は、はじめ直径2mm くらいのほぼ同大の淡紅色の小斑で、わずかに隆起し、円形に近いものが散在するが、時間がたつと数を増し近隣融合して、2~4mm 径の辺縁の明瞭な不規則な形の疹となる。

小児の皮疹は軽いことが多いが、(写真c, d) 著明に現われた疹は猩紅熱に似る(写真a, g) そのような例では、発疹の極期の第2疹日ころは、顔が軽度に浮腫状になる。(写真g)



風疹感染後の血清抗体価の推移

(風疹の胎児に及ぼす影響に関する研究班：臨床とウイルス，特別号，p.60，1976)