

齋賀医院壁新聞

文献情報と院内案内 齋賀医院ホームページに戻る場合戻るボタンをおしてください

検索ボックス

<< 2021年02月 >>

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

最近の記事

- (02/12) [ファイザーの新型コロナ・ワクチンのパンフレット](#) CDCより
- (02/09) [アナフィラキシー再考](#)
- (02/08) [心房細動:NEJMの総説](#)
- (02/08) [本院に新しいアイテム誕生](#)
- (02/05) [心房細動に対するクライオアブレーションと薬物療法との比較 その2](#)

最近のコメント

- [本院に新しいアイテム誕生](#) by (02/09)
- [結腸憩室炎のガイドライン](#) medscapeより by (02/07)
- [心房細動に対するクライオアブレーションと薬物療法との比較 その2](#) by (02/06)
- [新型コロナワクチンのQ&A : NEJMより](#) by (01/25)
- [新型コロナワクチンの安全性・特にRNAワクチン](#) by (01/24)

タグクラウド

カテゴリ

- [小児科](#)(195)
- [循環器](#)(214)
- [消化器](#)・[PPI](#)(136)
- [感染症](#)・[衛生](#)(185)
- [糖尿病](#)(116)
- [喘息](#)・[呼吸器](#)・[アレルギー](#)(89)
- [インフルエンザ](#)(105)
- [肝臓](#)・[肝炎](#)(60)
- [薬](#)・[抗生剤](#)・[サプリメント](#)・[栄養指導](#)(47)
- [脳](#)・[神経](#)・[精神](#)・[睡眠障害](#)(42)
- [整形外科](#)・[痛風](#)・[高尿酸血症](#)(30)
- [ワクチン](#)(35)
- [癌関係](#)(10)
- [脂質異常](#)(28)

<< [新型コロナワクチンのQ&A : NEJMより](#) | [TOP](#) | [慢性腎臓病の患者さんにコロナワクチンを推奨](#) >>

2021年01月27日

ファイザーのワクチン接種後のアレルギー反応

ファイザーのワクチン接種後のアレルギー反応

Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine



ファイザーのワクチン接種後にアナフィラキシー反応が稀ながら報告されて以来、接種に消極的な方もいます。欧米では日本と比べ物にならない程の感染爆発が起きており、コロナ死亡率対ワクチン効果（一見、費用対効果）という面で国を挙げての接種体制です。

アメリカCDCとVAERSが中心となり、接種後の副作用を集計しています。副作用をアナフィラキシーとそれ以外、更にアレルギー反応と非アレルギー反応とに分けて報告しています。その内容が雑誌JAMAに載っていますので纏めてみます。

- 1) 期間は2020年12月14日からです。
対象はファイザーのワクチンを1回目に接種した1,893,360人（女性;1,177,527人 男性;648,327人 不明;67,506人）です。
21例がアナフィラキシーと認定しています。 11.1/100万人の比率となります。
4例が入院、17例が救急搬送されています。
その内20例は、回復して自宅に復帰しています。
死亡例はありません。
- 2) 接種後のアナフィラキシー反応発生までの時間は、平均で13分です。(2~150分)
15分以内が15例(71%)、30分以内が18例(86%)です。
(30分以上の例は下記の文献中の表から推測するに、やや特異な例と思われる。)
- 3) 最も多い症状は
・蕁麻疹 ・血管浮腫 ・発疹 ・咽頭閉塞感
アナフィラキシー反応を起こした人の71%(17/21)は、既往歴に何らかのアレルギー疾患がありました。
33%(7/21)は、以前にアナフィラキシー反応の既往歴を持っていました。
(インフルエンザワクチンなど)
- 4) 同じ期間にVAERSに報告された、アナフィラキシー反応でないアレルギー反応は83例ありました。
・掻痒感 ・発疹 ・喉の痒み ・引っかき傷 ・軽度の呼吸器症状
(このことから想像するに、アナフィラキシーかの判定は全身症状の重さのようです。接種後何らかの全身症状があれば、アナフィラキシーの前兆と判断したほうが良さそうです。)
- 5) 対策としては
・アナフィラキシー反応に対する十分な対応の設置
・接種を受ける人の問診（禁忌や注意事項の該当）
・接種後、15~30分間は経過観察を実施する担保
・医師や他のヘルスケアの専門家による、アナフィラキシー反応に対する兆候の早期把握
・迅速なエピネフリン注射の対応
・アナフィラキシー反応を起こした人の適切な搬送
・30分以上の観察後に、集団接種場所より離れてからアレルギー症状が出現した場合には、迅速に医療機関を受診するよう指導する。

私見)

国も地方自治体も集団接種を想定しています。コロナ以前はワクチンの有害事象予防のために、インフルエンザを含め個別接種の方向ではなかったでしょうか？

- [甲状腺・副甲状腺](#)(18)
- [婦人科](#)(8)
- [泌尿器・腎臓・前立腺](#)(35)
- [熱中症](#)(7)
- [日記](#)(18)
- [その他](#)(68)

過去ログ

- [2021年02月](#)(7)
- [2021年01月](#)(16)
- [2020年12月](#)(17)
- [2020年11月](#)(15)
- [2020年10月](#)(17)
- [2020年09月](#)(19)
- [2020年08月](#)(14)
- [2020年07月](#)(17)
- [2020年06月](#)(14)
- [2020年05月](#)(21)
- [2020年04月](#)(18)
- [2020年03月](#)(18)
- [2020年02月](#)(18)
- [2020年01月](#)(19)
- [2019年12月](#)(14)
- [2019年11月](#)(15)
- [2019年10月](#)(18)
- [2019年09月](#)(18)
- [2019年08月](#)(14)
- [2019年07月](#)(14)
- [2019年06月](#)(16)
- [2019年05月](#)(14)
- [2019年04月](#)(18)
- [2019年03月](#)(19)
- [2019年02月](#)(19)
- [2019年01月](#)(15)
- [2018年12月](#)(16)
- [2018年11月](#)(20)
- [2018年10月](#)(20)
- [2018年09月](#)(18)
- [2018年08月](#)(24)
- [2018年07月](#)(18)
- [2018年06月](#)(18)
- [2018年05月](#)(20)
- [2018年04月](#)(19)
- [2018年03月](#)(20)
- [2018年02月](#)(14)
- [2018年01月](#)(14)
- [2017年12月](#)(20)
- [2017年11月](#)(17)
- [2017年10月](#)(22)
- [2017年09月](#)(18)
- [2017年08月](#)(20)
- [2017年07月](#)(23)
- [2017年06月](#)(19)
- [2017年05月](#)(19)
- [2017年04月](#)(22)
- [2017年03月](#)(20)
- [2017年02月](#)(18)
- [2017年01月](#)(21)

以降はカテゴリーで検索してください。

[RDF Site Summary](#)
[RSS 2.0](#)

また、原則論として重大な有害事象が5例/10万人発生したワクチンは、中止の方向ではなかったでしょうか？ 今後この値に接近しないでしょうか？

今は緊急事態宣言です。

わかりました！ ならば、なお一層の体制強化を打ち出してもらいたいと思います。

[コロナワクチン 副作用 JAMA.pdf](#)

[ワクチン 厚労省.pdf](#)

0 | 0
いいね！

 ブックマーク

【ワクチンの最新記事】

- [65歳以上の2回目の肺炎球菌ワクチンは？](#)
- [インフルエンザワクチンは妊娠のanyti...](#)
- [ワクチンの保冷庫管理と大規模停電](#)
- [米国予防接種スケジュール・2020年版](#)
- [65歳以上の肺炎球菌ワクチンについて](#)

posted by 斎賀一 at 18:05 | [Comment\(0\)](#) | [ワクチン](#)

この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

