

トップ > ニュース > 医療一般 >

新型コロナ対策
4カ国Webミーティング
アジアに学ぶ
日本の“出口戦略” 20時

COVID-19
新型コロナウイルス
関連情報

eディテリング

獲得可能
アップ数 **2,700up**

締め切りまで
7日以内 **900up**

【第6回！】直近1週間（5月7日[木]～13日[水]）のCOVID-19 疑い例の診療状況について

アンケートに答える

50pt

デイリークエスト 2up
常勤の求人情報を確認
(1日1回まで)

本日の臨床Q&Aクイズ

甲状腺機能亢進症の症状に下痢がある。



クイズに答えて
アップを獲得する

人気記事ランキング

週間	月間
----	----

COVID-19転帰予測、入院時のDタイム測定が有用
医療一般
1

COVID-19にレムデシビルが有意な効果示せず、早期なら有効か...
ジャーナル四天王
2

コロナ危機が医師の収入を直撃！生活防衛策あれこれ
医師のお金の話
3

新型コロナ、抗原検出用キットの活用に関するガイドライン発表...
医療一般
4

COVID-19、ICU入室患者の臨床的特徴/JAMA
ジャーナル四天王
5

COVID-19に特認承認のレムデシビル、添付文書と留意事項が公開
医療一般
6

COVID-19、医師のツイートから行政手続きが効率化
医療一般
7

新型コロナウイルス、感染患者の臨床的特徴

喘息治療配合剤 アドエア
100F-CAS2 28-60吸入用
500F-CAS2 28-60吸入用
50J27A-9 120吸入用
250J27A-9 120吸入用

大腸がん検診、家族歴あればより早期の開始を

提供元：HealthDay News

ツイート 公開日：2020/05/12

親やきょうだいに大腸がん患者がいる人は、40歳やそれよりも早く検診を受けることで大腸がんの早期発見につながるとされている。しかし、この検診の開始基準が導入された2008年以前には、40歳代で大腸がんと診断された患者のほとんどが、家族歴に基づく早期の検診を受けていなかった可能性があることが、米カリフォルニア大学サンディエゴ校（UCSD）ムーアがんセンターのSamir Gupta氏らの研究で示された。研究結果の詳細は「Cancer」4月20日オンライン版に発表された。



米国がん協会（ACS）は2018年のガイドライン改訂で、大腸がんリスクが平均的と考えられる人の検診の開始対象年齢を50歳から45歳に引き下げた。一方、第一度近親者（親やきょうだい）に大腸がん既往者がいる人に対しては、2008年にガイドラインが策定された時点で、40歳からか、あるいは第一度近親者が大腸がんと診断された年齢よりも10年早い年齢から検診を受け始めることを推奨している。

Gupta氏らは今回、1998～2007年に国際的な大腸がん患者の家族レジストリ（Colon Cancer Family Registry）に登録された40～49歳の大腸がん患者2,473人と、大腸がんではない772人（対照群）を対象に追跡調査を実施した。

その結果、大腸がんと診断された患者の4人に1人、対照群の10人に1人は、第一度近親者に大腸がん患者がいることが分かった。しかし、これら大腸がん患者のうち、現行のガイドラインで推奨されている、家族歴に基づく早期の検診を受けていた人の割合は2%に満たなかった。

大腸がんの家族歴があり、より早期に検診を開始する基準を満たした患者の98.4%は、実際に診断された年齢よりも若いうちに検診を開始することが推奨された可能性があった。Gupta氏らは、ガイドラインの推奨に従って、より早期に検診を受けていれば、治療可能な段階で大腸がんを発見したり、進行を予防できたりしていた可能性が考えられたとしている。

Gupta氏は「大腸がんリスクを予測する上で家族歴が重要であることが、患者や医師の間で十分に認識されていないのではないかと指摘。「大腸がんの家族歴の重要性について啓発するとともに、家族歴をきちんと評価し、それに対処できるように体制を整えていく必要がある」と述べている。

一方で、Gupta氏は「この研究では、医師がきちんと家族歴を聴取したのか、また、ガイドラインの推奨事項を考慮したり、より早期の検診開始を勧めたりしたのかなどに関する情報は得られなかった」と説明している。同氏によれば、これまでの研究では、大腸がんの家族歴は聴取されていないことが多く、聴取されていても正確であるとは限らないことが報告されているという。

この報告を受けて、米ハーバード大学医学部内科准教授のAndrew Chan氏は、「この研究から、大腸がん患者は自分自身の家族歴を認識しておらず、家族歴について医師に正確に伝えていない可能性があることが判明した。したがって、医師は患者に、診断時の年齢を含めた家族歴について必ず尋ねるべきだ」と強調。「その情報に基づいて、医師は適切なタイミングで検診を受けるよう患者に勧め、患者もそれに従う必要がある」と述べている。

[2020年4月20日/HealthDayNews]Copyright (c) 2020 HealthDay. All rights reserved. [利用規定はこちら](#)

eディテリング

神経障害性疼痛治療における
便なスクリーニングツール

1ページ
100up

神経障害性疼痛治療
おける簡便な
スクリーニング
診断

私の治療ノート - 糖尿病治療
における食後高血糖の重要性

06:33
100up

私の治療
ノート
糖尿病治療に
関する食後高血糖

下野先生に聞きましたSGLT2
阻害薬の患者指導実践 Q&A

1ページ
未視聴

下野先生に聞きました
SGLT2阻害薬の患者指導実践

体内時計の乱れが「朝の目
め」に及ぼす影響

01:33
未視聴

体内時計の乱れが
「朝の目め」に及ぼす影響

ストレスによる下痢で悩む
さんの治療のポイント

06:32
100up

ストレスによる
下痢で悩む
患者さんの
治療の
ポイント

選択的SGLT2阻害剤「フォ
ジーガ」の1型糖尿病に対する効

04:40
未視聴

フォジーガ
フォーシーガ錠 1錠
1型糖尿病に対する効果

おすすめ期間中のすべてのeディテ
リング視聴するとコンプアップ20upが獲得

まだコンプアップ
を獲得できません

Nobelpharma
メラトニン受容体作動性入眠改善剤
メラトベル 0.1
Melatobel[®] granules 0.2% for pediatric
「効能又は効果」、「用法及び用量」、「禁忌を含む使用上の注意」
最新の添付文書添付文書をご確認ください。

医療一般

Dr.倉原の 俺の本棚
 疲れた医師の精神安定本
 Dr.倉原の「俺の本棚」
 9

バイオの 火曜日
 COVID-19にBCGは本当に有効か？医療者対象の国際試験が進行中
 バイオの火曜日
 10

医師閲覧ランキング

林先生とコム太が楽しく解説！ CareNet.comの使い方
 視聴時間 4分50秒

つねに学ぶ、
 つねに成長する
 「医師」×「意志」を
 サポートします

MEDuLiTe
 Medical Education for a Lifetime

乳がん診療 Frontline
 CareNet × 乳がん研究会

Gupta S, et al. Cancer. 2020 Apr 20. [Epub ahead of print]

掲載内容はケアネットの見解を述べるものではありません。(すべての写真・図表等の無断転載を禁じます。)

視聴されていないコンテンツがあります

このページを印刷する

ツイート

[最新ニュース]

-  クロピドグレル、70歳以上の非ST上昇ACS患者に有用 / Lancet (2020/05/15)
-  COVID-19、主要5種の降圧薬との関連認められず / NEJM (2020/05/15)
-  脳内大血管閉塞に対する血栓回収療法に血栓溶解療法の併用は不要か？ (解説...) (2020/05/15)
-  新型コロナ、抗原検出用キットの活用に関するガイドライン発表 / 厚労省 (2020/05/15)
-  糖尿病治療ガイド2020-2021が完成 / 日本糖尿病学会 (2020/05/15)
-  パクリタキセル+ペバシズマブは非小細胞肺癌2次治療以降の選択肢となるか... (2020/05/15)
-  ADHDとうつ病との関連 (2020/05/15)
-  COVID-19治療薬の研究・開発、国内の動向 (2020/05/15)

抗悪性腫瘍剤 CDK4/6及び6期専用
ベージニオ



製造販売元: 日本イーライリリー株式会社

ルパフィ
 田辺三菱製薬

Gaba は、ご家族のご優待価格で通え
 ※二親等以内のご家族様もご利用
 今ならキャンペーン実施中
Gaba マンツーマン

ケアネットからのお知らせ
ご登録情報はお変わりありません
 メールアドレス
 ポイント交換や会員情報重要なお知らせの際に
 勤務先情報
 地域にあった情報をご提供
会員情報変更はこちら

番組視聴はコチラ
生坂一門からの挑戦状に悩め
GM カンファ
 2019

