

ホームへ

検索結果

[すべて](#)
[症状・疾患](#)
[画像](#)
[薬剤](#)
[検査](#)
[医療計算機](#)
[診療報酬点数表](#)
 すべての薬剤で検索を行う**エフィエント錠2.5mg エフィエント錠3.75mg エフィ...** (薬剤)[>抗血小板薬 \(チエノピリジン系薬\) >プラスグレル>](#)

【適応】

・用量 通常、成人には、投与開始日に**プラスグレル**として20mgを1日1回経口投与し、その後、維持用量として1日1回3.75mgを経口投与する。

【注意】

【関連情報】

**不安定狭心症** (症状・疾患)

初期治療例

生成のカスケードを一刻も早く遮断する治療であり、アスピリン (バイアスピリン)、クロピドグレル (プラビックス)、**プラスグレル (エフィエント)** のローディング、ヘパリンのポーラス静注が該当する。胸痛の持続がある場合は、血圧

初診時

初診時

**非ST上昇型心筋梗塞** (症状・疾患)

概要

アスピリンに追加して、チエノピリジン系薬剤であるクロピドグレル (プラビックス) または**エフィエント (プラスグレル)** を併用する。冠動脈造影を施行し、PCIの適応となればその時点で**エフィエント (プラスグレル)**

急性冠症候群の急性期評価・治療対応のまとめ

急性期 (カテーテル治療前)

**ST上昇型心筋梗塞** (症状・疾患)

初診時

**エフィエント錠[20mg]** 1錠 [適用内/用量内/◎ST上昇型急性心筋梗塞]

フォローアップ時

初診時

**安定狭心症** (症状・疾患)

血行再建

する。ステント療法後の抗血小板薬：ポイント：ステント療法後に、少量アスピリンとチクロピジンないしはクロピドグレルないしは**プラスグレル**の2剤をベアメタルステントでは最低PCI後1カ月、薬剤溶出ステント

**プラビックス錠25mg プラビックス錠75mg** (薬剤)[>抗血小板薬 \(チエノピリジン系薬\) >クロピドグレル>](#)

【関連情報】

) 同効薬一覧 パナルジン細粒など (チクロピジン) プラビックス錠など (クロピドグレル) **エフィエント錠**など (**プラスグレル**) プリリント錠など (チカグレロル) ■腎機能低下

**抗凝固薬 (薬理)** (症状・疾患)

概要

板上の受容体であるP2Y12を阻害することにより選択的に抗血小板作用を持つチエノピリジン系薬であるチクロピジン (パナルジン)、クロピドグレル (プラビックス)、**プラスグレル (エフィエント)** 保険適用に関しては、各薬

抗血小板薬 (チエノピリジン系薬)

**ワーファリン錠0.5mg ワーファリン錠1mg ワーファリン...** (薬剤)[>経口ビタミンK拮抗薬>ワルファリン>](#)

【併用注意】

チクロピジン塩酸塩 **プラスグレル**塩酸塩 ベラプロストナトリウム リマプロスト アルファデクス等 相互に出血傾向を増強することがあるので、併用する場合には観察を十分に行い、相手薬剤の用量を調節するなど十分注意

**ワーファリン顆粒0.2%** (薬剤)[>経口ビタミンK拮抗薬>ワルファリン>](#)

【併用注意】

チクロピジン塩酸塩 **プラスグレル**塩酸塩 ベラプロストナトリウム リマプロスト アルファデクス等 相互に出血傾向を増強することがあるので、併用する場合には観察を十分に行い、相手薬剤の用量を調節するなど十分注意

**パナルジン錠100mg パナルジン細粒10%** (薬剤)[>抗血小板薬 \(チエノピリジン系薬\) >チクロピジン>](#)

【関連情報】



ホームへ

[チカグレル](#) [ファイエント錠](#)など（[プラスグレル](#)） [ブリリント錠](#)など（チカグレル）

ワルファリンK錠0.5mg TNP】 [ワルファリンK錠1mg 1...](#) (薬剤)

>[経口ビタミンK拮抗薬>ワルファリン>](#)

【併用注意】

チクロピジン塩酸塩 [プラスグレル](#)塩酸塩 [ベラプロストナトリウム](#) [リマプロスト](#) [アルファデクス](#)等 相互に出血傾向を増強することがあるので、併用する場合には観察を十分に行い、相手薬剤の用量を調節するなど十分注意

[ワルファリンK錠1mg「日新」](#) (薬剤)

>[経口ビタミンK拮抗薬>ワルファリン>](#)

【併用注意】

チカグレル [チクロピジン塩酸塩](#) [プラスグレル](#)塩酸塩 [ベラプロストナトリウム](#) [リマプロストアル](#) [ファデクス](#)等 相互に出血傾向を増強することがあるので、併用する場合には観察を十分に行い、相手薬剤の用量を調節

[ワルファリンK錠0.5mg「トーワ」](#) [ワルファリンK錠1mg...](#) (薬剤)

>[経口ビタミンK拮抗薬>ワルファリン>](#)

【併用注意】

チカグレル [チクロピジン塩酸塩](#) [プラスグレル](#)塩酸塩 [ベラプロストナトリウム](#) [リマプロスト](#) [アルファデクス](#)等 相互に出血傾向を増強することがあるので、併用する場合には観察を十分に行い、相手薬剤の用量を調節

[ワルファリンK錠0.5mg「テバ」](#) [ワルファリンK錠1mg「...](#) (薬剤)

>[経口ビタミンK拮抗薬>ワルファリン>](#)

【併用注意】

チクロピジン塩酸塩 [プラスグレル](#)塩酸塩 [ベラプロストナトリウム](#) [リマプロスト](#) [アルファデクス](#)等 相互に出血傾向を増強することがあるので、併用する場合には観察を十分に行い、相手薬剤の用量を調節するなど十分注意

[ワルファリンK錠1mg「F」](#) (薬剤)

>[経口ビタミンK拮抗薬>ワルファリン>](#)

【併用注意】

チカグレル [チクロピジン塩酸塩](#) [プラスグレル](#)塩酸塩 [ベラプロストナトリウム](#) [リマプロスト](#) [アルファデクス](#)等 相互に出血傾向を増強することがあるので、併用する場合には観察を十分に行い、相手薬剤の用量を調節

[ブリリント錠60mg](#) [ブリリント錠90mg](#) (薬剤)

>[抗血小板薬（チエノピリジン系薬）>チカグレル>](#)

【関連情報】

[パナルジン細粒](#)など（チクロピジン） [ブラビックス錠](#)など（クロピドグレル） [エフィエント錠](#)など（[プラスグレル](#)） [ブリリント錠](#)など（チカグレル） ■ 処方日数上限に関する情報 処方上限

[ホーム](#) | [今日の臨床サポートについて](#) | [サービス利用規約](#) | [プライバシーポリシー](#) | [ユーザー同意書](#) | [編集者一覧](#) | [COIについて](#)  
[お問い合わせ](#)

本サイトの知的財産権は全てエルゼビアまたはコンテンツのライセンサーに帰属します。私的利用及び別途規定されている場合を除き、本サイトの利用はいかなる許諾を与えるものでもありません。

本サイト、そのコンテンツ、製品およびサービスのご利用は、お客様ご自身の責任において行ってください。本サイトの利用に基づきいかなる損害についても、エルゼビアは一切の責任及び賠償義務を負いません。また、本サイトの利用を以て、本サイト利用者は、本サイトの利用に基づき第三者に生じるいかなる損害についても、エルゼビアを免責することに合意したことになります。

本サイトを利用される医学・医療提供者は、独自の臨床的判断を行使すべきです。本サイト利用者の判断においてリスクを正当なものとして受け入れる用意がない限り、コンテンツにおいて提案されている検査または処置がなされるべきではありません。医学の急速な進歩に鑑み、エルゼビアは、本サイト利用者が診断方法および投与量について、独自に検証を行うことを推奨いたします。

エルゼビア製品 : | [Procedures Consult](#) | [ナーシング・スキル日本版](#) | [SafetyPlus](#)

関連製品 : [ClinicalKey](#) | [Journals Consult](#) | [The Lancet](#) | [Cell](#)

Copyright ©Elsevier Japan KK 2011-2018 All rights reserved

RELX Group™