





年齢別で使用できるコロナ治療薬

—新型コロナ重症化リスク因子がある人—

- 重症化リスク因子とは、65歳以上の高齢者、悪性腫瘍、慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、2型糖尿病、高血圧、脂質異常症、肥満、喫煙、固形臓器移植後の免疫不全、妊娠後期などのこと

		軽症～中等症			
		内服		点滴	
薬剤	対象者	ラゲブリオ (モルヌピラビル)	パキロビッドパック (ニルマトレルビル・リトナビル)	ロナプリーブ (カシリビマブ/イムデビマブ)	ゼビュディ (ソトロビマブ)
				発症から5日以内に5日間服用 薬剤の大きさは約2cm	発症から5日以内に服用（1回に2種3錠を5日間服用） 薬の飲み合わせに注意が必要のため 「お薬手帳」を持参して服用中のすべての薬を医療者に伝えましょう （とくに高血圧や不整脈治療薬、睡眠薬など）
小児				12歳以上かつ40kg以上	
妊婦・授乳婦 子どもを望む男女		子供を望む男女が服用する場合、服用中と服用後4日間の避妊を推奨	※	※	※
65歳未満		●	●	●	●
65歳以上		●	●	●	●

※妊婦：治療上の有益性が危険性を上回る時に服用可、授乳婦：授乳の継続又は中止を検討


出典：各添付文書、新型コロナウイルス感染症診療の手引き第7.2版、COVID-19 に対する薬物治療の考え方第13.1版

Copyright © 2022 CareNet, Inc. All rights reserved.

年齢別で使用できるコロナ治療薬

—新型コロナ重症化リスク因子がない人—

・薬剤が使用できる方は、重症度分類が中等症II以上（酸素投与が必要）の場合に限ります

薬剤	軽症※～重症	中等～重症		
	点滴	内服/点滴	点滴	内服
対象者	ベクルリー (レムデシビル)	ステロイド薬 (デキサメタゾン)	アクテムラ (トシリズマブ)	オルミエント (バリシチニブ)
	投与目安は 軽症者が3日間 中等症以上が5日間 (最大10日間) 肝/腎機能障害、ア ナフィラキシーな どに注意 ※軽症は適応外使用	重症感染症の適応で使 用 投与目安は10日間 血糖値が高い方、 消化性潰瘍リスクがあ る方は注意が必要	発症から7日以内に使用。 ステロイ ド薬と併用 、人工呼吸器管理・ ECMO導入を要する方に入院下で投 与 結核、B型肝炎の既往、糞線虫症リ スクを確認。また、心疾患や消化管 穿孔リスクがある方は注意が必要	入院から3日以内に投与。総投与 期間は14日間、 レムデシビルと 併用 抗凝固薬の投与等による血栓塞 栓予防を行う 結核・非結核性抗酸菌症やB型 肝炎リスクを確認
小児 	3.5kg以上 ●	●		
妊婦・授乳婦 子どもを 望む男女 	● ※	プレドニゾロン40mg/日に 変更 ●	● ※	
65歳未満 	●	●	●	●
65歳以上 	●	●	●	●

※妊婦：治療上の有益性が危険性を上回る時に服用可、授乳婦：授乳の継続又は中止を検討

出典：各添付文書、新型コロナウイルス感染症診療の手引き第7.2版、COVID-19 に対する薬物治療の考え方第13.1版

Copyright © 2022 CareNet, Inc. All rights reserved.