

# 用法・用量追加のご案内

長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤

## イナビル<sup>®</sup>吸入粉末剤 20mg

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび上記製品につきまして、2016年8月26日付で、A型又はB型インフルエンザウイルス感染症の予防に用いる場合の用法・用量(成人および小児の単回吸入投与)の追加が承認されましたので、ご案内申し上げます。

今後とも、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

2016年9月

記

予防も  
治療も同じ

### ●【用法・用量】の追加承認内容 (下線部)

変更前	変更後
2. 予防に用いる場合 成人及び10歳以上の小児： ラニナミビルオクタン酸エステルとして20mgを 1日1回、2日間吸入投与する。	2. 予防に用いる場合 成人： <u>ラニナミビルオクタン酸エステルとして 40mgを単回吸入投与する。また、20mgを1日 1回、2日間吸入投与することもできる。</u> 小児： <u>10歳未満の場合、ラニナミビルオクタン酸 エステルとして20mgを単回吸入投与する。</u> <u>10歳以上の場合、ラニナミビルオクタン酸 エステルとして40mgを単回吸入投与する。</u> また、20mgを1日1回、2日間吸入投与するこ と <u>も</u> できる。

### 【お願い】

- ・今般の【用法・用量】の追加に伴い【使用上の注意】も改訂されております。「用法・用量/使用上の注意改訂のお知らせ」ならびに「改訂添付文書」をご参照賜りますようお願い申し上げます。
- ・流通在庫の関係から改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでに日数が必要ですので、ご使用に際しましては、「用法・用量/使用上の注意改訂のお知らせ」並びに「改訂添付文書」をご参照賜りますようお願い申し上げます。

以上

<参考>用法・用量に関連する使用上の注意(抜粋)

3.本剤は、1容器あたりラニナミビルオクタン酸エステルとして20mgを含有し、薬剤が2箇所<sup>①</sup>に充填されているので、次表のとおり吸入投与すること。

	治療	予防
成人及び10歳以上の小児	2容器(計4箇所)	1)単回投与の場合 2容器(計4箇所) 2)2日間投与の場合 1回あたり1容器(1回あたり2箇所)
10歳未満の小児	1容器(2箇所)	1容器(2箇所)