

## 市原市

## ヒトパピローマウイルス感染症予防接種 9価ワクチン（シルガード）の2回接種について

### 1. 対象者

- 小学校6年生相当年齢～15歳の誕生日の前日（15歳未満）までの女子
- 15歳になるまでの間に1回目の接種を行えば、2回接種が可能となります

### 2. 接種方法



※1 9価ワクチン（シルガード）3回接種の標準的な接種方法は、2回目は初回接種の2か月後、3回目は初回接種の6か月後に実施します。（2回目及び3回目の接種が初回接種の2か月後及び6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以上あけます）

※2 9価ワクチン（シルガード）2回接種の標準的な接種方法は、初回接種から6か月後に2回目を接種します。（初回接種から2回目までの接種間隔は最低5か月以上とし、5か月未満で2回目を接種した場合は合計3回の接種が必要となります）

### 3. 注意事項

- 2回接種は、9価ワクチン（シルガード）の定期化に合わせ、令和5年4月から開始となります。
- すでに2価及び4価ワクチンを用いて定期接種の一部を終了した方が、残りの接種を9価ワクチン（シルガード）行う交接種の場合は、合計3回の接種となります。
- 2価または4価ワクチンで接種を開始した方が、9価ワクチンで接種を完了する場合は、9価ワクチンの接種間隔で行ってください。

# 【ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種間隔について】

令和5年4月1日現在

1. 定期接種対象者：小学校6年生～高校1年生の年齢に相当する女子(標準的な接種年齢は、中学1年生相当年齢)
2. キャッチアップ接種対象者:平成9年4月2日～平成19年4月1日生まれの女子(令和6年度は平成19年度生まれまでを含む)

## 9価シルガード

1回目の接種を  
15歳になるまでに  
受ける場合



1回目の接種を  
15歳になってから  
受ける場合



## 4価ガーダシル



## 2価サーバリックス



3種類いずれも、1年以内に接種を終えることが望ましい。

※1 1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

※2・※3 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2) 3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。

※4・※5 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※4) 3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。