

ケアネットライブ Oncology

マルっとわかる
オンコロジー・エマーゼンシー
(がんの緊急症)

無料配信中

COVID-19
新型コロナウイルス
関連情報

2型糖尿病治療薬に関する調査

アンケートに答える

～2000pt

デイリークエスト 2up
ポイント交換先を確認

デイリークエスト 2up
ハイクラス専門の転職サイトを
確認(1日1回まで)

eディテレーリング
スタンプを確認

ケアネット会員限定！
会員特典

本日の臨床〇×クイズ
症例対照研究は介入研究である。

クイズに答えて
アップを獲得する

今日の所見

診断名は？ 出題日 2022/09/15

人気記事ランキング

週間

月間

1

鼻腔拭い液のコロナ検査、自己採取と医療者で結果は異なるか／...
ジャーナル四天王

2

コロナ潜伏期間は変異株ごとに短縮、年齢による違いもメタ解析
医療一般

3

ブースター接種、異種のほうが効果が持続する可能性
医療一般

4

新型コロナの重症度と予後を予測するバイオマーカーを発見／横...
医療一般 日本発エビデンス

moderna

2022年8月より、「製造販売承認」を
武田薬品工業株式会社から継承いたしました。

ファイザーとモデルナのBA.1対応追加接種用2価ワクチンを承認／厚生労働省

提供元：ケアネット ツイート いいね！ 0 公開日：2022/09/14

厚生労働省は9月12日、ファイザーおよびモデルナのオミクロン株BA.1に対応した新型コロナウイルス2価ワクチンを特例承認したことを発表した。2価ワクチンの販売名は、ファイザーが「コミナティRTU筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）」、モデルナが「スパイクボックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）」となる。両ワクチンともに追加接種用で、ファイザー製は12歳以上、モデルナ製は18歳以上が対象となる。



両2価ワクチンの用法・用量は、ファイザー製は「追加免疫として、1回0.3mLを筋肉内に接種する」とし、モデルナ製は「追加免疫として、1回0.5mLを筋肉内に接種する」としている。現時点では、両剤ともに前回の接種から少なくとも5カ月経過した後接種することができることとされているが、同日に開かれた薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会において、接種間隔を短縮すべきとの指摘があったため、今後、海外の動向、有効性、安全性等の情報を踏まえ、短縮する方向で検討し、10月下旬までに結論を得ることとされた。

両2価ワクチンの有効性と安全性については以下のとおり。

- ファイザー製「コミナティRTU筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）」**
- ・海外第III相試験によると、追加接種後1カ月時点でのオミクロン株BA.1に対する血清中和抗体価について、幾何平均抗体価（GMT）は、本剤接種群（178例）では711.0（両側95%信頼区間[CI]：588.3～859.2）、従来の1価ワクチン接種群（163例）では455.8（両側95%CI：365.9～567.6）となり、幾何平均比（GMR）は1.56（両側95%CI：1.17～2.08）であった。
 - ・接種後7日間に報告された主な副反応として、注射部位疼痛、疲労、頭痛、筋肉痛、悪寒、関節痛、発熱があった。

- モデルナ製「スパイクボックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）」**
- ・海外第II/III相試験によると、追加接種後28日時点でのオミクロン株に対する血清中和抗体価について、幾何最小二乗平均（GLSM）は、本剤接種群（334例）では2,479.890（両側95%CI：2,264.472～2,715.801）、従来の1価ワクチン接種群（260例）では1,421.243（両側95%CI：1,282.975～1,574.412）となり、幾何平均比（GMR）は1.745（両側97.5%CI：1.493～2.040）であった。
 - ・接種後7日間に報告された主な副反応として、注射部位疼痛、疲労、頭痛、筋肉痛、関節痛、悪寒があった。

両ワクチンともに忍容性はおおむね良好で、反応原性および安全性プロファイルは従来の1価ワクチンの追加接種と一致していたという。

なお、現在米国で緊急使用許可されている両社のBA.4/BA.5対応2価ワクチンについて、ファイザーは9月13日付のプレスリリースにて、厚生労働省に承認事項一部変更申請を行ったことを発表した。また、モデルナも準備が整い次第申請を行う予定だとしている。

（ケアネット 古賀 公子）

Medical Gateway

情報チェックでアップ獲得チャンス

Web 講演会 >

eディテレーリング

【バフセオ】実践：HIF-PH阻害剤の使い方(後編)

1ページ
100up

3年にわたるジャヌビア(R)錠の長期使用結果について

04:34
100up

ベタニスの使用成績調査における年齢別解析データ

04:52
100up

早期治療強化の重要性とスージャヌ配合錠の可能性

05:33
100up

【モデルナ社製COVID-19ワクチン】CSO解説シリーズ（1）...

22:09
100up

高齢者の心疾患管理～ポリファーマシー対策とアドヒアランスの...

09:01
100up

もっと見る

おすすめ期間中のすべてのeディテレーリングを視聴するとコンプアップ20upが獲得可能！

まだコンプアップ
を獲得できません

 コロナ感染6日目、抗原検査陰性なら隔離解除は可能か？
医療一般

 ピークアウトしつつも、第7波で終わるはずもなく
現場から木曜日

 外来でお怒りの患者さんにどう対応するか
Dr.デリぼんの診察室観察日記

 HEPAフィルター空気清浄機により新型コロナウイルス除去に成功...
医療一般 日本発エビデンス

 「学会提言」がTwitterで大炎上、国産コロナ薬への便宜では？
バスった金曜日

 BA.1/2既感染者はBA.5の防御効果が高い？
NEJM 医療一般

医師閲覧ランキング

 MEDuLiTe
製品紹介をし
中立的な臨床医学動画
世界最大医学メディアの
医師生涯教育
今すぐチェック

 Breast cancer Frontline
乳がん診療 Frontline
CareNet × がん研有線

 がん研有線
エキスパートの手術手技を動画で配信

参考文献・参考サイトはこちら

厚生労働省 オミكرون株対応ワクチンの効能・効果、用法・用量の一部変更承認について

掲載内容はケアネットの見解を述べるものではありません。（すべての写真・図表等の無断転載を禁じます。）

関連記事

 モデルナとファイザーのBA.4/5対応追加接種用2価ワクチンを承認／FDA
医療一般（2022/09/02）

 5～11歳への3回目ファイザー製ワクチンを承認／厚生労働省
医療一般（2022/08/31）

 モデルナ、オミكرون株対応2価ワクチンを国内承認申請
医療一般（2022/08/17）

 視聴されていないコンテンツがあります

このページを印刷する ツイート いいね！ 0

【最新ニュース】

 重度虚血性左室収縮障害、薬物療法へのPCI上乗せ効果はあるか／NEJM
(2022/09/15)

 院外心停止昏睡への酸素補給療法、制限的vs.非制限的／NEJM
(2022/09/15)

 JAK阻害薬とSteroid併用の重要性（解説：山口佳寿博氏/田中希宇人氏）
(2022/09/15)

 認知症と肥満・糖尿病
(2022/09/15)

 HR+/HER2+進行乳がんへのアベマシクリブ+トラスツズマブ+フルベストラン...
(2022/09/15)

 低BMIの蛋白尿リスクに“朝食抜き”が影響
(2022/09/15)

 BA.2.75「ケンタウロス」に対するコロナ治療薬の効果を比較／NEJM
(2022/09/15)

 入園時に語彙力の高い園児はクラスでの振る舞いも良好
(2022/09/15)

 どうする
3回目
接種？

 Doctors' Picks
ESMO
2022 特設サイト
世界規模のがん学会、
エキスパートの
注目演題はこれ！

 初期研修医限定！2022年7月開講！
研修医 必修
オンラインサロン
研修医の兄貴と一緒に
現場で使える必修スキルを身につけよう！
講師 国保旭中央病院 救急救命科医長 坂本 壮 氏
参加のお申込みこちら

 医師紹介キャンペーン
1,000pt
紹介はかんたん！
詳細はこちら