














# ブリーズヘラー® 製品一覧

製品名		エナジア® 吸入用カプセル 中用量・高用量	アテキュラ® 吸入用カプセル 低用量・中用量・高用量	ウルティプロ® 吸入用カプセル	オンブレス® 吸入用カプセル 150µg	シーブリ® 吸入用カプセル 50µg
専用 ブリーズヘラー®						
製剤写真		<p>エナジア® 吸入用カプセル 高用量</p>  <p>エナジア® 吸入用カプセル 中用量</p> 	<p>アテキュラ® 吸入用カプセル 高用量</p>  <p>アテキュラ® 吸入用カプセル 中用量</p>  <p>アテキュラ® 吸入用カプセル 低用量</p> 	<p>ウルティプロ® 吸入用カプセル</p> 	<p>オンブレス® 吸入用カプセル150µg</p> 	<p>シーブリ® 吸入用カプセル50µg</p> 
成分	LABA*	○	○	○	○	○
	LAMA**	○	○	○	○	○
	ICS***	○	○	○	○	○
適応	気管支喘息	○	○	○	○	○
	COPD	○	○	○	○	○
	効能又は効果	気管支喘息(吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入β <sub>2</sub> 刺激剤及び長時間作用性吸入抗コリン剤の併用が必要な場合)	気管支喘息(吸入ステロイド剤及び長時間作用性吸入β <sub>2</sub> 刺激剤の併用が必要な場合)	慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解(長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β <sub>2</sub> 刺激剤の併用が必要な場合)	慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解	慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解

\*インダカテロール酢酸塩(エナジア®、アテキュラ®)、インダカテロールマレイン酸塩(ウルティプロ®、オンブレス®)


\*\*グリコピロニウム臭化物

\*\*\*モメタゾンフランカルボン酸エステル


# ブリーズヘラー®とは？

薬剤をうまく吸入できたかどうか  
分かるデバイスです

閉じた状態



開いた状態



カラ  
カラ  
カラ



吸入時は  
カプセルが回転し  
カラカラ音が  
鳴ります。

吸入後には  
カプセルの中の  
粉がなくなっ  
ています。

## 吸入方法


step 1

ブリーズヘラー®に  
カプセルを1つだけ  
充填します。



step 2

ボタンを  
しっかり押し、  
離します。




step 3

息をはき出してから  
正面を向いたまま  
速く、できるだけ深く  
吸入します。



吸入が終わったら…

空になっていることを確認し、  
カプセルを捨てます。



吸入できているか  
チェック!



- ☑ 吸入している時にカラカラ音がしていますか？
- ☑ 吸入したあとカプセルの中の粉がなくなっていますか？

製造販売  
ノバルティス ファーマ株式会社  
東京都港区虎ノ門1-23-1 〒105-6333

ENZ00003CI0001  
2021年1月作成