ボスミン鼻腔噴霧

ex 体重10kgではボスミン0.1ml

一応上限を0.3mlとする

必要物品

- ボスミン外用液0.1%(室温保存)
- 生理食塩水
- ・25G 針付きシリンジ1ml
- ・ルミネッシュ(鼻あて部分のみ)
- ・三方活栓(蓋として使用)
- 薬杯
- 遮光袋
 - ① 薬杯に生理食塩水を適宜入れる
- ◎ 25Gシリンジでボスミン体重辺りの指示量を吸う
- ③ 針をシリンジから外す
- ボスミン入りシリンジで生理食塩水を0.5mlまで吸い上げる
- ⑤ Airをシリンジに少量入れ混和
- ⑤ 三方活栓で蓋をする(レバーの向きは動かさずそのまま使用)
- ◎ 遮光袋に使用期限を記入しシリンジと鼻あてを入れる
- ⑤ 使用期限前の交換予約をする。

使用方法説明

エピペンの説明書を用い説明 エピペン or ボスミン鼻噴霧を選択してもらう

> ②!! アナフィラキシーの可能性が高い場合 救急車要請 ボスミンシリンジを転倒混和 三方活栓(蓋)を外し、ルミネッシュ鼻あてを装着 両鼻腔に分けて噴霧

足を高くして仰向けで待つ(嘔吐の場合は顔を横に向ける)

救急搬送されなかった場合

症状が治まっていても医療機関受診時ボスミン鼻腔噴霧を伝えてもらう

必要に応じボスミン鼻腔噴霧交換予約 物品は新たに用意し使用方法の確認も行う