

⑥「共有すべき事例」の再発・類似事例

小児において年齢別に処方量や剤形が異なる医薬品

ヒヤリ・ハット事例のうち、「小児において年齢別に処方量や剤形が異なる医薬品に関する事例」が23件報告されています（集計期間：2015年1月1日～12月31日）。特に注意を要する医薬品を以下に示します。

ブランド名 (成分名)	剤形 (規格)	小児の年齢別用法・用量	
気管支拡張剤			
ホクナリン (ツロブテロール)	テープ (0.5mg、1mg、 2mg)	0.5歳～ 3歳未満	1回0.5mg 1日1回
		3歳～ 9歳未満	1回1mg 1日1回
		9歳～	1回2mg 1日1回
その他のアレルギー用薬			
アレグラ (フェキソフェナジン 塩酸塩)	ドライシロップ (5%)	0.5歳～ 2歳未満	1回15mg (製剤量0.3g) 1日2回
		2歳～ 7歳未満	1回30mg (製剤量0.6g) 1日2回
		7歳～12歳未満	1回30mg (製剤量0.6g) 1日2回 (適宜増減可)
		12歳～	1回60mg (製剤量1.2g) 1日2回 (適宜増減可)
アレロック (オロパタジン塩酸 塩)	顆粒 (0.5%)	2歳～ 7歳未満	1回2.5mg (製剤量0.5g) 1日2回
		7歳～	1回5mg (製剤量1g) 1日2回
	錠・OD錠 (30mg、60mg)	7歳～12歳未満	1回30mg 1日2回 (適宜増減可)
キプレス (モンテルカスト)	細粒 (4mg/0.5g/ 包)	1歳～ 6歳未満	1回4mg (製剤量0.5g1包) 1日1回
	チュアブル錠 (5mg)	6歳～	1回5mg 1日1回
クラリチン (ロラタジン)	ドライシロップ (1%)	3歳～ 7歳未満	1回5mg (製剤量0.5g) 1日1回
	錠・レディタブ錠 (10mg)	7歳～	1回10mg (製剤量1g) 1日1回
ザイザル (レボセチリジン塩 酸塩)	シロップ (0.05%)	0.5歳～ 1歳未満	1回1.25mg (製剤量2.5mL) 1日1回
		1歳～ 7歳未満	1回1.25mg (製剤量2.5mL) 1日2回
		7歳～15歳未満	1回2.5mg (製剤量5mL) 1日2回
	錠 (5mg)	7歳～15歳未満	1回2.5mg 1日2回
ジルテック (セチリジン塩酸 塩)	ドライシロップ (1.25%)	2歳～ 7歳未満	1回2.5mg (製剤量0.2g) 1日2回
		7歳～15歳未満	1回5mg (製剤量0.4g) 1日2回
	錠 (5mg)	7歳～15歳未満	1回5mg 1日2回

※ 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 平成27年年報235頁 図表6-4を改変

