

斎賀医院壁新聞

文献情報と医院案内 斎賀医院ホームページに戻る場合戻るボタンをおしてください

検索ボックス

検索

<< 2024年11月 >>

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

最近の記事

- (11/29)一括アップデート!子どものワクチン・予防接種
(11/27)若い人の二次高血圧症の実態
(11/25)インフルエンザにマスクと手洗いは有効か?
(11/22)喘息発作のリリーパーにもステロイド配合吸入薬が有効
(11/20)子宮筋腫・NEJM総説

最近のコメント

- 鉄欠乏性貧血における鉄剤の服用 by (09/13)
23価肺炎球菌ワクチンの局所反応 by (07/11)
急性心不全のラシックスの効果減弱 by (06/10)
小児の腸重積・ロタウイルスワクチンとの関係について by (05/02)
Ⅱ型糖尿病患者にスルホニル尿素薬の有効性について by (04/19)

タグクラウド

カテゴリ

- 小児科(259)
循環器(314)
消化器・P P I(187)
感染症・衛生(329)
糖尿病(157)
喘息・呼吸器・アレルギー(123)
インフルエンザ(118)
肝臓・肝炎(67)
薬・抗生剤・サプリメント・栄養指導(58)
脳・神経・精神・睡眠障害(74)
整形外科・痛風・高尿酸血症(45)
ワクチン(98)
癌関係(14)
脂質異常(31)
甲状腺・内分泌(22)
婦人科(17)
泌尿器・腎臓・前立腺(61)
熱中症(7)

<< 吸入療法の仕方の間違い | TOP | 妊婦でのインフルエンザ・ワクチンの安全性 >>

2016年09月21日

糖尿病患者の目標血圧は

糖尿病患者の目標血圧は

Blood pressure and complications in individuals with type 2 diabetes and no previous cardiovascular disease



Sprint試験でもご紹介しましたが、糖尿病患者以外では120以下が目標血圧です。今回のイギリスのBMJの論文では、過去に心血管疾患を起こしていない糖尿病患者での至適血圧の調査です。

血圧が110~119の群は、130~139の群に比べて、死に至らない心筋梗塞の危険率は0.76で、死に至らない脳卒中の危険率は0.85と低下していましたが、逆に心不全では1.20、全死亡は1.28と危険率は上がっていました。120~129は両群のちょうど中間の危険率です。この逆転現象（120以下にすると却って死亡率が上がる）は心血管疾患とは関係なく、120以下では合併症の有無が関係しているかもしれないとしています。その事についての詳細な記載はない様です。

私見)

糖尿病患者では、無理なく降圧が達成できれば、120が目標で良いのかもしれませんが、濃厚治療までして、120以下になくても良いのかもしれませんが。





Fig 2 | Kaplan-Meier analysis of non-fatal cardiovascular events, showing proportion of patients with events (composite of nonfatal myocardial infarction or stroke) in different systolic blood pressure groups

過去ログ

- 2024年11月(11)
 - 2024年10月(13)
 - 2024年09月(14)
 - 2024年08月(12)
 - 2024年07月(15)
 - 2024年06月(14)
 - 2024年05月(14)
 - 2024年04月(12)
 - 2024年03月(14)
 - 2024年02月(13)
 - 2024年01月(19)
 - 2023年12月(17)
 - 2023年11月(13)
 - 2023年10月(15)
 - 2023年09月(12)
 - 2023年08月(16)
 - 2023年07月(15)
 - 2023年06月(14)
 - 2023年05月(15)
 - 2023年04月(15)
 - 2023年03月(15)
 - 2023年02月(14)
 - 2023年01月(15)
 - 2022年12月(12)
 - 2022年11月(16)
 - 2022年10月(15)
 - 2022年09月(13)
 - 2022年08月(17)
 - 2022年07月(13)
 - 2022年06月(15)
 - 2022年05月(15)
 - 2022年04月(14)
 - 2022年03月(15)
 - 2022年02月(14)
 - 2022年01月(16)
 - 2021年12月(14)
 - 2021年11月(17)
 - 2021年10月(17)
 - 2021年09月(13)
 - 2021年08月(16)
 - 2021年07月(12)
 - 2021年06月(16)
 - 2021年05月(16)
 - 2021年04月(14)
 - 2021年03月(18)
 - 2021年02月(19)
 - 2021年01月(16)
 - 2020年12月(17)
 - 2020年11月(15)
 - 2020年10月(17)
- 以降はカテゴリで検索してください。



結局、糖尿病患者では、従来のガイドラインのように140以下が至適かもしれません。

[Blood pressure and complications in individuals with type 2.pdf](#)

0

0

いいね！

ポスト

ブックマーク

【糖尿病の最新記事】
持続血糖測定CGMは低血糖の発見に有用
糖尿病治療薬・GLP-1の内視鏡検査にお..
糖尿病治療薬・メトグルコに腎保護作用があ..
糖尿病患者の慢性腎臓病に対するオゼンピック..
オゼンピックは心不全の利尿薬の使用を削減..

posted by 斎賀一 at 20:08 | [Comment\(0\)](#) | [糖尿病](#)

この記事へのコメント