

脳震盪



脳震盪とは脳が頭蓋内で激しくゆり動くために起ります

- 症状は頭痛、吐き気、めまい、集中力低下です。
- 症状は数日から数か月続くことがあります。
- 殆ど完全に回復します。
- 病変はCT検査をしても明らかになりません。

脳外傷



あなたのお子さんと同様な軽度な頭部外傷は100人中1人が場合により脳外傷（脳損傷）があります。

- ・頭部外傷がひどい場合は脳の中や周りに出血をおこすことがあります。
 - ・上記が疑われる場合は入院して経過観察が必要な場合があります。
- 時に外科的治療も考慮されます。

頭部CT検査

もしも、あなたのお子さんが脳外傷（脳損傷）の疑いがあれば頭部CT検査を実施する判断を主治医かCT検査の実施医師と相談し決定してください。



自宅で経過観察する場合の注意事項

頭部外傷後の1~2日間で症状が同じか良くなっていれば脳の周りや中に重大な出血はありません。しかし下のような症状が新たに出たり、悪くなったらすぐに救急外来を受診してください。



なにか元気がない、反応が鈍い



安静にしても頭痛がひどい



食事がとれないくらい吐き気がする



フラフラしたり歩けない



上手くしゃべれないか周りの人が良く分からない